



DIRECCIÓN DE AGRICULTURA CARTA TECNOLÓGICA CULTIVO DE ARROZ A CHUZO CON TECNOLOGÍA PARA VARIEDADES CICLOS CORTO DE 100 - 110 DIAS - AÑO 2019 (Oryzica, Turipana 7)



^{*}Si el monitoreo demuestra la necesidad de aplicación de plagicidas

DIRECCIÓN DE AGRICULTURA CARTA TECNOLÓGICA DEL CULTIVO DE ARROZ CHUZO CON TECNOLOGÍA

Para variedades de Ciclos Intermedios de 115 - 125 días (Ligero, Blue Bonnett, Rexoro, Picaporte y Santa Rosa) - 2019




^{*}Si el monitoreo demuestra la necesidad de aplicación de plagicidas

DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

CARTA TECNOLÓGICA DEL CULTIVO DE ARROZ CHUZO CON TECNOLOGÍA

Para variedades de Ciclos Corto e Intermedios de 135 - 150 días - Biofortificado (IDIAP GAB 2; IDIAP GAB 6; IDIAP GAB 8; IDIAP GAB 11) - 2019




^{*}Si el monitoreo demuestra la necesidad de aplicación de plagicidas

DIRECCIÓN DE AGRICULTURA CARTA TECNOLÓGICA CULTIVO DE ARROZ MECANIZADO

Para Variedades de Ciclos Corto e Intermedio de 115 - 125 días

(IDIAP 38; FCA 9738; FEDEARROZ 50) - 2019



^{*}Si el monitoreo demustra la necesidad de aplicación de plaguicidas

DIRECCIÓN DE AGRICULTURA CARTA TECNOLÓGICA CULTIVO DE ARROZ MECANIZADO

Para Variedades de Ciclos Corto de 110 - 115 días - Año 2019

(IDIAP 145-05; IDIAP 54-05; IDIAP 52-05;Estrella 71; Estrella 91; FCA 97116; CFX 18; CFX Tempizque CL; Fedearroz 473; Colombia siglo XXI, Federroz 50; Fedearroz 2000)

DIAS ANTES DE LA SIEMBRA FASE REPRODUCTIVA FASE MADURACIÓN FASE VEGETATIVA Germinación y Formación / Emergencia / crecimiento sin Ahijamiento Embuchamiento Floración Lechoso Pastoso Maduración Grano Panícula panícula hijos / Plantulas DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA 30 15 8 0 10 20 25 - 30 50 55 - 60 70 - 75 85 - 90 100 - 110 115 Aradura o Romeo Primer pase de rastra Segundo pase de rastra Tercer pase de rastra, siembra y abono completo Primera aplicación de herbicida post-temprana Segunda aplicación de herbicida post.tardía Primera aplicación de urea *Monitoreo del complejo ácaro -hongo - bacterias Segunda aplicación de Urea Aplicación al complejo acaro ABC Protección de espiga fungicidas- insecticidas Maduración fisiologica del grano Cosecha

^{*}Si el monitoreo demustra la necesidad de aplicación de plaguicidas